İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve No: 30.09.2013 / 9334

CHARITY Mısır tarlalarında sorun olan yıllık ve çok yıllık çimensi otlarla bazı geniş yapraklı yabancı otlara karşı, çıkış sonrası kullanılan selektif bir ilaçtır. Uygulamadan hemen sonra yapraklar vasıtasıyla hızla bünyeye alınır, otlarda gelişim durur ve yapraklar kırmızı-mor renge dönüşür. 15-20 gün içinde otlar sararıp kururlar. Kanyaşta rizomları etkiler, yeni sürgün vermelerini önler.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Yabancı Ot Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
MISIR* (4-8 Yaprak)	Çimensi yabancı otlar Benekli darıcan *(Echinocloa colonum)* Darıcan *(Echinochloa crus-galli)* Çatalotu *(Digitaria sanguinalis)* Yeşil kirpi darı = Kirpi darı *(Setaria viridis)*	125 ml/da Kardeşlenme öncesi veya kardeşlenme içinde oldukları erken dönemde (2-6 yaprak)	56 gün
	Kanyaş *(Sorghum halepense)*	125 ml/da İlacı bünyeye alacak yeterli çıkışlar olduktan sonra (10-30 cm boyda)	56 gün
	Geniş yapraklı yabancı otlar Kırmızı köklü tilkikuyruğu (*Amaranthus retroflexus*) Köpek üzümü *(Solanum nigrum)* Domuz pıtrağı *(Xanthium strumarium)* Semizotu *(Portulaca oleracea)*	125 ml/da Gelişimlerin 2-6 yapraklı olduğu genç dönemde	56 gün

***Tatlı mısır ve cin mısırda kullanmayınız.**

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.
02 Eylül 2024

INNOCHEM TARIM İLAÇLARI
SAN. ve TİC. A.Ş

CHARITY

Yağ Bazlı Süspansiyon Konsantre (OD)

Grup	B2	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)

40 g/L Nicosulfuron

- **Önce etiketi okuyunuz.**
- **Evde kullanmayınız.**
- **Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.**
- **Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.**
- **İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.**

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

- **Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ
Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ
Genel Tedbirler: Maddenin bulaştığı bütün giysiler derhal çıkarılmalıdır. Zehirlenme belirtileri geç ortaya çıkabileceğinden kazazedeyi en az 48 saat gözetim altında bulundurun.
Cilt: Cildi hemen en az 15 dakika süreyle bol su ile yıkayınız. Ürünün bulaştığı giysi ve ayakkabıları hemen çıkarınız. Belirtiler artarsa tıbbi yardım alınız.
Yutma: Herhangi bir sıvı vermeyiniz. Bilinçsiz bir kişiye asla ağzından herhangi bir şey vermeyiniz. Tıbbi bakım alınız.
Göz: Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil olmak üzere en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Bir uzmana başvurunuz.
Soluma: Solunduğu takdirde temiz havaya çıkarınız. Soluma, yutma ya da temas halinde tıbbi yardım alınız ve mümkünse ilacın etiketini ya da güvenlik bilgi formunu bulunuz.

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

Net miktarı:
Azami perakende satış fiyatı:

Ek-2

İÇİNDEKİLER: Nicosulfuron

ZARARLILIK İŞARETLERİ



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ
H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ
P273: Çevreye verilmesinden kaçının.
P280: Koruyucu eldiven/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P501: İçeriği/ kabı yerel/ bölgesel/ ulusal/ uluslararası yönetmeliklere uygun bertaraf edin.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmayınız.
- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak muhafaza ediniz ve başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

INNOCHEM TARIM İLAÇLARI SAN. ve TİC. A.Ş
Tarım Mah. Aspendos Bulv. Sancaklar İş Merkezi No:98
K:3 D:302 Muratpaşa/ANTALYA Tel:(0242) 321 34 01
Antalya Numune V.D 465 035 9329
Mersis: 0465035932500017 - Tic. Sic. No: 108907
Bahadır Soğlam

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içerisinde kullanılmalıdır.

KALİBRASYONU
Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi sağlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ
- İyi bir ot kontrolü için, iyi bir kaplama ilaçlama yapılmasına dikkat edilmelidir.
- İlaçlamayı günün sıcak saatlerinde yapmayınız. İlaçlamadan sonra 4-5 saat içinde yağış olmamalıdır.
- Organik fosforlu toprak insektisitleri ile aynı yıl içinde kullanmayınız. Mısır gelişimi etkilenir.
- Yapraktan uygulanan organik fosforlu ilaçlarla arada en az 7 gün olmalıdır.

Ürün Münavebesi: CHARITY uygulanan tarlada 4 ay sonra sadece buğday, arpa ve soya fasulyesi, 10 ay sonra ise istenilen kültür bitkisi ekilebilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ
CHARITY adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup B2** olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **CHARITY**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip **(Grup B2 harici)** bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU
Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması önerilmez.

INNOCHEM TARIM İLAÇLARI
SAN. ve TİC. A.Ş

CHARITY

Yağ Bazlı Süspansiyon Konsantre (OD)

Grup	B2	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)

40 g/L Nicosulfuron

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ
Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.
02 Eylül 2024

DEPOLAMA DURUMU
Normal (serin ve kuru) şa rijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI
Firma, bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA
NINGBO CYCLE CHEMICAL CO., LTD.
9-1, No. 16, South Xinghai Road, Hi-Tech District, Ningbo, Zhejiang, ÇİN

ÜRETİM TESİSİ
HEFEI XINGYU CHEMICAL CO., LTD
Cyclic Economic Industrial Zone, Feidong County, Hefei, ÇİN

RUHSAT SAHİBİ FİRMA
INNOCHEM TARIM İLAÇLARI SAN.ve TİC A.Ş
Tarım Mah. Aspendos Blv. Mancalar İş Merkezi Sit. No 98/302 Muratpaşa/ANTALYA
Tel: 0 242 312 00 42
www.innochem.com.tr

INNOCHEM®
TARIM İLAÇLARI SAN. ve TİC. A.Ş
Tarım Mah. Aspendos Bulv. Mancalar İş Merkezi No:98
K:3 D:302 Muratpaşa/ANTALYA Tel:(0242) 321 34 01
Antalya Kurumlar VD 465 035 9329
Mersis: 0465035932900017 - Tic. Sic. No: 100987
Bahadır Soğlem