İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih Ve Numarası: 06.05.2026/14123

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Elma	Elma içkurdu *(Cydia pomonella)*	7,50 ml/100 l su	3 gün
Kiraz, Vişne	Kiraz sineği *(Rhagoletis cerasi)*	15 ml/100 l su	3 gün
Kuru İncir	Testereli böcek *(Oryzaephilus surinamensis)*	30 ml/100 m^2 (En fazla 5 l su ile)	49 gün
Kuru Üzüm	Testereli böcek *(Oryzaephilus surinamensis)*	30 ml/100 m^2 (En fazla 5 l su ile)	49 gün
Kuru İncir ve Kuru Üzüm Depoları	Testereli böcek *(Oryzaephilus surinamensis)*	30 ml/100 m^2 (Boş ambar yüzey ilaçlaması)	21 gün (tahta ve beton yüzeyde)
Tütün	Tütün güvesi *(Ephestia elutella)*	30 ml/100 m^2 (en fazla 5l su ile)- (Ambar)	15 gün
	Tatlı kurt *(Lasioderma serricorne)*	30 ml/100 m^2 (en fazla 5 L su ile)- (Ambar)	15 gün
	Tütün tripsi *(Thrips tabaci)*	30 ml/da	14 gün
Zeytin	Zeytin sineği *(Bactrocera oleae)*	12,5 ml/100 l su	21 gün
	Zeytin güvesi *(Prays oleae)*	15 ml/100 l su (Çiçek nesli ve Meyve nesli)	21 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.Uygulamalarda sera koşullarında dekara 60-100 l su kullanılabilir.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Dr. Nesrin ÇAKIR ARSLAN
Daire Başkanı

INNOCHEM TARIM İLAÇLARI SAN. ve TİC. A.Ş

DEPLASMAN 050 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	3A	İnsektisit (Böcek İlacı)

50 g/l Deltamethrin

- **Önce etiketi okuyunuz.**
- **Evde kullanmayınız.**
- **Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.**
- **Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.**
- **İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.**

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ: Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.
Soluma: Solunduğunda tehlikeli ürün olarak sınıflandırılmış olmamakla birlikte zehirlenme belirtileri görülmesi halinde etkilenen kişinin temiz havaya çıkarılması önerilmektedir.
Cilt: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. Cilde temas etmesi su ve sabunla temizlenmesi önerilmektedir. Ciltte bozulma olması durumunda (kaşınma, kızarıklık, şişme, kabarma) Güvenlik Bilgi Formu ile doktora başvurunuz.
Göz: Gözlerle temas durumunda etkilenen kişinin gözlerini ovmasını veya kapatmasını engelleyerek ortam sıcaklığında bol suyla en az 15 dakika durulayınız. Kontakt lens varsa çıkarınız. Tıbbi yardım alınız
Yutma: Ürün GBF'yi göstererek derhal tıbbi yardım alınız. Kusturmayınız, ağız yoluyla herhangi bir şey vermeyiniz. Yutulmasından etkilenmiş olabileceği için ağzını ve boğazını suyla çalkalayınız.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: Özel bir antidotu yoktur Semptomik tedavi uygulanır.

TARIM VE ORMANLIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

25 Eylül 2026

Net miktarı:
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Deltamethrin, Etandiol, 1,2-benzizotiyazol-3(2H)-on

ZARARLILIK İŞARETLERİ



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ
H301+H331: Yutulduğunda veya solunduğunda toksiktir.
H302: Yutulması halinde zararlıdır.
H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ
P261: Buharını solumaktan kaçının.
P273: Çevreye verilmesinden kaçının.
P280: Koruyucu eldiven/Koruyucu kıyafet/solunum koruma/Göz koruyucu/koruyucu ayakkabi kullanın.
P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P501: İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası yönetmeliklere uygun bertaraf edin.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yer altı ve yer üstü sulara bulaştırmayınız.
- Dökülmesi halinde üzerine talaş veya toprak dökünüz, sonra süpürüp toplayınız ve usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Boş ürün ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayınız.
- **KULLANMADAN ÖNCE ÇALKALAYINIZ.**

INNOCHEM TARIM İLAÇLARI SAN. ve TİC. A.Ş
Altınova Sinan Mah. Atatürk Cad. No: 39 İç Kapı No: 39
KEPEZ/ANTALYA Tel: 0242 322 00 42
Antalya Kurumlar V.D. 465 035 9329
Mersis:0465035932900017 - Tic. Sic. No: 108987
Şule ÇANAKCI
Ruhsatlandırma Uzmanı

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Elma - Elma içkurdu: Mücadelede hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak, yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir. Döllere ait ilk uygulama zamanlarını sağlıklı bir şekilde saptamada ve yoğunluğun tespit edilmesinde tahmin ve uyarı yöntemi kullanılır. Bu yönteme göre uygulamaya karar verdikten sonra birinci döle karşı 2, ikinci döle karşı 1 olmak üzere toplam 3 uygulama yapılmalıdır.

Kiraz – Kiraz sineği: "Sarı yapışkan tuzak+amonyak kapsülü" kullanılarak veya fenolojik gözlem yapılarak ilk ergin görüldükten sonra en geç bir hafta içinde uygulama yapılmalıdır. Genellikle bir uygulama yeterli olmaktadır. Ancak, birinci uygulamadan sonra, tuzaklardaki sinek yakalanmaları devam ediyorsa, ilacın etki süresi ve hasat tarihi dikkate alınarak ikinci uygulama yapılabilir.

Kuru Meyve Zararlıları: Kuru meyve zararlılarına karşı uygulama 3 şekilde yapılır.

1-Boş Ambar Uygulaması: Gerekli kültürel önlemler alındıktan ve ambar kireçle badana edildikten sonra yapılır.

2-Fumigasyon: Depolama öncesi bulaşma almış olan ürünlere, depolamanın başında yapılır.

3-Dolu Ambar İlaçlaması: Depolama süresinde bulaşma görüldüğü takdirde uygulanır. Bu uygulama ostikolu tuzaklarda 3-4, açık tuzaklarda 10-15 ergin böcek görüldüğünde yapılır.

Tütün – Tütün güvesi – Tatlı kurt: Boş depolarda, ambar temizliği yapıldıktan sonra yapılmalıdır. 100 m2 için gerekli olan su miktarı hesaplanmalıdır. Uygulamadan önce pencereler, kapılar ve havalandırma sistemleri kapanmalıdır. m^2 üzerinden tavsiye edilen bitki koruma ürünü miktarını, hiç kuru yer kalmayacak şekilde bütün yüzeylere uygulanmalıdır.

Tütün – Tütün tripsi: Yaprak başına ortalama 5 tütüntripsi bulunduğunda uygulama yapılmalıdır.

Zeytin – Zeytin sineği: Bölge farklılıkları dikkate alınarak, meyvelerin yumurta koyma olgunluğuna geldiği dönemde vuruk sayımları yapılarak, yeterli vuruk ve tuzaklarda yakalanan Zeytin sineği ergin sayısında artış görülmesi halinde, uygulama yapılmalıdır. Vuruk sayımları haftada 1-2 kez, ağaçların güney-doğu kısımlarındaki parlak, yağlanmaya
başlamış, flüoresans sarı renkteki meyvelerde yapılarak, vuruk yüzdesi belirlenir. Kitle halinde tuzakla yakalama ve kısmi dal ilaçlamasi için 400-500 adet meyve, kaplama ilaçlama için ise 200 adet meyve kontrol edilir ve (%) vuruk oranı saptanır. Yapılan sayımlar
sonucunda, salamuralık çeşitlerde %1 vuruk, yağlık çeşitlerde ise %3-4 vuruk saptandığında, yer aletleri ile kısmi dal uygulaması veya kaplama uyglaması yapılmalıdır.

Zeytin – Zeytin güvesi: Zararlının tercihen sadece meyve dolüne karşı uygulama yapılmalıdır. Kontrol edilen mercimek büyüklüğündeki zeytin meyvelerinin %10'unda canlı "yumurta+larva" olması halinde uygulama yapılmalıdır. Mayıs ayının ikinci yarısında yapılan kontrollerle uygun uygulama zamanı saptanır. Ancak zararlının mevsim başında yaprak ve yeni sürgünlerde %10'dan yüksek düzeylerde zarar yapması halinde, çiçek dölünde ilk kelebeklerin yakalanmasından 7-10 gün sonra uygulama yapılmalıdır. Uygulama zamanını belirlemek için Delta tipi feromon tuzaklardan yararlanılır. Bu tuzaklar nisan ayında bahçelere asılarak haftada bir kez kontrol edilir.

DEPLASMAN 050 SC hakkında bir şikâyetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: DEPLASMAN 050 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **DEPLASMAN 050 SC'nin** aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3A) harici bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: DEPLASMAN 050 SC'nin diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.

INNOCHEM TARIM İLAÇLARI SAN. ve TİC. A.Ş

DEPLASMAN 050 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	3A	İnsektisit (Böcek İlacı)

50 g/l Deltamethrin

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

T.C. Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN Daire Başkanı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.
25 Eylül 2026

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süreyle ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Firma ürünün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Ürünün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

INNOCHEM TARIM İLAÇLARI SAN.ve TİC A.Ş
Altınova Sinan Mahallesi, Akay Sokak No:4, İç Kapı No:39,
Kepez/ANTALYA
Tel: (0242) 312 00 42 | www.innochem.com.tr

ÜRETİM TESİSİ

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
Kırımlı OSB. Mah. Zeytin Dalı Bulvarı No:36 Merkez/AKSARAY

Şule ÇANAKCI
Ruhsatlandırma Uzmanı

INNOCHEM TARIM İLAÇLARI SAN. ve TİC. A.Ş
Altınova Sinan Mah. Akay Sok. No: 4 İç Kapı No: 39
KEPEZ / ANTALYA Tel:(0242) 312 00 42
Antalya Kurumlar V.D. 465 035 9329
Mersis:0465035932900017 - Tic. Sic. No: 108987