İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve No: 06.11.2019/11498

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Kontrol Ettiği Yabancı Otlar	Uygulama Dozu ve Zamanı
Soğan	Tilkikuyruğu *(Alopecurus myosuroides)* Kırmızı köklü tilkikuyruğu *(Amaranthus retroflexus)* Horozibiği *(Amaranthus spp.)* Farekulağı *(Anagallis arvensis= Anagallis caerulea)* Kısır yabani yulaf *(Avena sterilis=Avena ludoviciana)* Adana Pancarı *(Beta adanensis)* Çobançantası *(Capsella bursa-pastoris)* Sirken *(Chenopodium album)* Şeytan elması *(Datura stramonium)* Çatalotu *(Digitaria sangyinalis)* Darıcan *(Echinochloa crus-galli)* Şahtere = Hakiki şahtere *(Fumaria officinalis)* Semizotu *(Portulaca oleracea)* Çobandeğneği *(Polygonum spp.)* Yapışkan ot *(Setaria verticillata)* Adi yavşan otu *(Veronica hederifolia)*	300 ml/da Soğan ekiminden sonra çıkış öncesi
Pamuk	Kırmızı köklü tilkikuyruğu *(Amaranthus retroflexus)* Yeşil horozibiği *(Amaranthus viridis)* Sirken *(Chenopodium album)* Hint keneviri *(Corchorus olitorus)* Şeytan elması *(Datura stramonium)* Çatalotu *(Digitaria sanguinalis)* Benekli darıcan *(Echinocloa colonum)* Darıcan *(Echinochloa crus-galli)* Hanım döşeği *(Euphorbia prostrata)* Semizotu *(Portulaca oleracea)* Yapışkan ot *(Setaria verticillata)* Köpek üzümü *(Solanum nigrum)*	300 ml/da Ekim öncesi
Ayçiçeği	Kırmızı köklü tilkikuyruğu *(Amaranthus retroflexus)* Sirken *(Chenopodium album)* Duvar kazayağı *(Chenopodium murale)* Yatık sirken *(Chenopodium vulvaria)* Çakal kavunu *(Cucumis melo)* Benekli darıcan *(Echinocloa colonum)* Darıcan *(Echinochloa crus-galli)* Sütleğen *(Euphorbia spp)* Semizotu *(Portulaca oleracea)* Yapışkan ot *(Setaria verticillata)*	300 ml/da Ekimden hemen sonra, çıkış öncesi
Tütün	Kırmızı köklü tilkikuyruğu *(Amaranthus retroflexus)* Püsküllü çayır *(Bromus tectorum)* Sirken *(Chenopodium album)* Darıcan *(Echinochloa crus-galli)* Duvar arpası *(Hordeum murinum)* Domuz pıtrağı *(Xanthium strumarium)*	300 ml/da Tütün dikiminden hemen önce, dikim öncesi

INNOCHEM TARIM İLAÇLARI SAN. ve TİC. A.Ş

FORCE-FULL

Kapsül Süspansiyon (CS)

Grubu	K1	Herbisit (Yabancı Ot İlacı)

450 g/l Pendimethalin

- **Önce etiketi okuyunuz.**
- **Evde kullanmayınız.**
- **Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.**
- **Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.**
- **İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.**

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ
Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ
Solunma: Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.
Yutma: Kusturmayınız! Bilinci yerinde olmayan kişiye kesinlikle sıvı bir şey vermeyin. Ağzı iyice çalkalayın. Hemen doktora başvurun.
Cilt: Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi hemen su ve sabunla yıkayın. Yıkandıktan sonra belirtilerin baş göstermesi halinde hemen doktora başvurun
Göz: Kontak lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını arayarak gözleri hemen bol suyla yıkayınız. En az 15 dk durulamaya devam ediniz. Yıkandıktan sonra belirtilerin ortaya çıkması halinde hemen doktora başvurunuz.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ
Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Üzüre Başkanı

22 Ekim 2026

Net miktarı:
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Pendimethalin

ZARARLILIK İŞARETLERİ



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ
H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ
P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P273: Çevreye verilmesinden kaçının.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P363: Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P391: Dökküntüleri toplayın.
P501: İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası tüzüğe uygun olarak bertaraf edin.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmayınız.
- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız ve başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Uygulamadan iyi sonuç alabilmek için uygulama ile ilgili önerilere mutlaka uyunuz. Uygulamadan sonra makinayı temizleyiniz.
- Tohum yatağı iyi hazırlanmalı, toprak ince ve keseksiz olmalıdır.
- Tavsiye edilen ekin derinliklerine titizlikle uyulmalıdır.
- BKÜ'den en iyi sonucu alabilmek için toprak rutubeti şarttır.
- %10'dan fazla organik madde içeren topraklarda ot kontrolünde azalma olabilir. Kumlu topraklarda kullanılmamalıdır.
- Uygulama düzgün yapılmamışsa yabancı ot kontrolünü azaltır veya bitkiye zarar verir.
- Su göllenen yerlerde kullanmamalıdır.

Şule CANAKCI
Ruhsatlandırma Uzmanı

INNOCHEM TARIM İLAÇLARI SAN. ve TİC. A.Ş
Altınova Sinan Mah. Alt[illegible] İç Kapı No: 39
KEPEZ / ANTALYA Tel:(0242) 312 00 42
Antalya Kurumlar V.D. 465 035 9329
Mersis:0465035932900017 - Tic. Sic. No: 108987

Rev:04/18.08.2026

Fasulye	Kırmızı köklü tilkikuyruğu *(Amaranthus retroflexus)* Çobançantası *(Capsella bursa-pastoris)* Sirken *(Chenopodium album)* Çatalotu *(Digitaria sanguinalis)* Darıcan *(Echinochloa crus-galli)* Semizotu *(Portulaca oleracea)* Isırgan otu *(Urtica urens)*	300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi
Havuç	Sürünücü horoz ibiği *(Amaranthus blitoides)* Kırmızı köklü tilkikuyruğu *(Amaranthus retroflexus)* Püsküllü çayır *(Bromus tectorum)* Çobançantası *(Capsella bursa-pastoris)* Sirken *(Chenopodium album)* Gece sefası *(Ipomea stolonifera)* Adi eşek marulu *(Sonchus oleraceus)* Yabani hardal *(Sinapis arvensis)* Semizotu *(Portulaca oleracea)* Domuz pıtrağı *(Xanthium strumarium)*	300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içerisinde kullanılmalıdır.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi sağlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Soğan: İyi hazırlanmış keseklerden, yabancı otlardan ve daha önce ekilmiş bitkilerin artıklarından temizlenmiş olan toprağa, soğan ekiminden sonra çıkış öncesi uygulanır.
Pamuk: Ekim öncesinde tarla pülverizatörüyle uygulanır. Uygulamadan sonra emen veya en geç 4 gün içerisinde 4 gün içerisinde disk, rototiller veya tırmık ile toprağa 5-8 cm derinliğinde karıştırılmalıdır. Bu süre içerisinde 10 mm yağış düşerse, toprağa karıştırmaya gerek yoktur.
Ayçiçeği: Ekimden hemen sonra, yabancı otlar çıkış yapmadan (çıkış öncesi) uygulanmalıdır.
Tütün: Uygulama tütün dikiminden hemen önce, yabancı otlar çıkış yapmadan (dikim öncesi) yapılmalıdır.
Fasulye: Uygulama fasulye ekiminden hemen sonra, yabancı otlar çıkış yapmadan (çıkış öncesi) yapılmalıdır.
Havuç: Uygulama havuç ekiminden sonra yabancı otlar çıkış yapmadan (dikim öncesi) yapılmalıdır.

Kurak şartlarda FORCE FULL uygulamasını takip eden 3-7 gün içerisinde 5-10 mm sulama yapılmalıdır.

INNOCHEM TARIM İLAÇLARI SAN. ve TİC. A.Ş

FORCE-FULL

Kapsül Süspansiyon (CS)

Grubu	K1	Herbisit (Yabancı Ot İlacı)

450 g/l Pendimethalin

DEPOLAMA DURUMU: Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI: Firma, bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR
22 Ekim 2026

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN

Şule ÇANAKCI
Ruhsatlandırma Uzmanı
INNOCHEM TARIM İLAÇLARI SAN. ve TİC. A.Ş
Altınova Sinan Mah. Akay Sk. No: 4 İç Kapı No: 39
KEPEZ / ANTALYA Tel: (0242) 312 00 42
Antalya Kurumlar VD. 465 035 9329
Mersis:0465035932900017 - Tic. Sic. No: 108987

Fitotoksisite: **FORCE FULL** hastalık, kuraklık, aşırı rutubet, derin ekim, topraktaki pH oranının yüksek veya düşük olması, yüksek tuz oranı gibi nedenlerden zayıf ve stresli durumda olan bitkilerde fitotoksisite yapabilir.

FORCE-FULL hakkında bir şikâyetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

FORCE FULL adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup K1** olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bir bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **FORCE FULL** aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup K1** harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.

INNOCHEM TARIM İLAÇLARI SAN. ve TİC. A.Ş

FORCE-FULL

Kapsül Süspansiyon (CS)

Grubu	K1	Herbisit (Yabancı Ot İlacı)

450 g/l Pendimethalin

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR
12 Ekim 2026

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Eczacı

ÜRETİCİ FİRMA
MEGHMANI INDUSTRIES LTD
Plot No.27, Phase – I, GIDC Industrial Estate, Vatva,
Ahmedabad – 382445, Gujarat, INDIA

ÜRETİM TESİSİ
MEGHMANI INDUSTRIES LTD
Plot No. Z-6, Dahej SEZ Area, Village: Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch-392130, Gujarat, India.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA
INNOCHEM TARIM İLAÇLARI SAN. ve TİC A.Ş
Altınova Sinan Mah. Akay Sok. No:4 İç kapı No: 39 KEPEZ/ANTALYA
Tel: 0 242 312 00 42
www.innochem.com.tr

Şule ÇANAKCI
Ruhsatlandırma Uzmanı

INNOCHEM
TARIM İLAÇLARI SAN. ve TİC. A.Ş
Altınova Sinan Mah. Akay Sok. No: 4 İç Kapı No: 39
KEPEZ / ANTALYA Tel: (0242) 312 00 42
Antalya V.D. 465 035 9329
Mersis:0465035932900017 - Tic. Sic. No: 108987