İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarihi ve Numarası: 04.08.2026/14202

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates (Sera)	Kurşuni Küf *(Botrytis cinerea)*	150 g/100 l su	3 gün
Patlıcan (Sera)	Kurşuni Küf *(Botrytis cinerea)*	150 g/100 l su	3 gün
Biber (Sera)	Kurşuni Küf *(Botrytis cinerea)*	150 g/100 l su	3 gün
Domates (Sera)	Patlıcangillerde külleme *(Leveillula taurica)*	60 g/100 l su	3 gün
Domates (Tarla)	Patlıcangillerde külleme *(Leveillula taurica)*	100 g/da	3 gün
Hıyar, Kornişon (Sera)	Sebzelerde beyaz çürüklük *(Sclerotinia sclerotionum)*	150 g/100 l su	3 gün
Çilek	Kurşuni küf *(Botrytis cinerea)*	150 g/100 l su	3 gün
Karpuz	Kabakgillerde alternaria yaprak yanıklığı *(Alternaria cucumerina)*	100 g/da	3 gün
Kayısı	Çiçek monilyası *(Monilinia laxa = Sclerotinia laxa)*	100 g/100 l su	7 gün
Şeftali, Nektarin	Çiçek monilyası *(Monilinia laxa = Sclerotinia laxa)*	75 g/100 l su	14 gün
Kiraz, Vişne	Çiçek monilyası *(Monilinia laxa = Sclerotinia laxa)*	75 g/100 l su	7 gün
Patates	Erken yaprak yanıklığı *(Alternaria solani)*	100 g/da	3 gün
Soğan	Soğan pası *(Puccinia porri)*	150 g/da	7 gün
Havuç	Külleme *(Erysiphe heraclei, Leveillula taurica)*	150 g/da	1 gün
Marul	Sebzelerde beyaz çürüklük *(Sclerotinia sclerotiorum)*	150 g/da	7 gün
Çim alanlarında	Toprak kökenli hastalıklar *(Fusarium spp., Rhizoctonia spp.)*	150 g/da	-
Karanfil (Sera)	Çökerten hastalığı *(Rhizoctonia spp.)*	150 g/100 l su	-

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
17 Eylül 2026 KABUL EDİLMİŞTİR.

INNOCHEM TARIM İLAÇLARI SAN. ve TİC. A.Ş

FUJİSAN

Suda Dağılabilen Granül (WG)

Grubu	C2:7	C3:11	Fungisit (Mantar İlacı)

%26,7 Boscalid + %6,7 Pyraclostrobin

- **Önce etiketi okuyunuz.**
- **Evde kullanmayınız.**
- **Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.**
- **Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.**
- **Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.**
- **İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız.**

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ
Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.
Solunum: Hastayı temiz havaya çıkarınız. Soluma güçlüğü varsa oksijen veriniz. Hemen doktora başvurunuz.
Cilt: Etkilenen vücut kısımlarını 10-15 dakika bol su ve sabun ile iyice yıkayınız. Eğer tahriş belirtileri varsa ürün etiketi ile doktora başvurunuz.
Göz: Gözlerinizi bol su ile en az 15 dakika yıkayınız. Lens varsa çıkarınız. Gerekirse doktora başvurunuz.
Yutma: Yutulduğu takdirde şişenin kendisi, etiket ve mümkünse bu bilgi kâğıdı ile bir doktora başvurunuz, kusturmaya çalışmayınız. Bilinci kapalı hastaya ağızdan bir şey vermeyiniz.

ANTİDOTU VE TEDAVİ: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

T.C. Dr. Nesrin CANTARCI Daire Başkanı

Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İçindekiler: Boscalid, Pyraclostrobin

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



ZARARLILIK İFADELERİ
H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ
P273: Çevreye verilmesinden kaçının.
P280: Koruyucu eldiven/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P501: İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası yönetmeliklere uygun bertaraf edin.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız ve usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

Şule CANAKCI
Ruhsatlandırma Uzmanı
INNOCHEM TARIM İLAÇLARI SAN. ve TİC. A.Ş
Altınova Sinan Mah. [illegible] Sk. No: 4 İç Kapı No: 39
KEPEZ / ANTALYA Tel: (242) 312 00 42
Antalya Kurumlar V.D. 465 035 9329
Mersis:0465035932900017 - Tic. Sic. No: 108987

Rev:02/04.09.2026

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içerisinde kullanılmalıdır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır. Domates de kurşuni küf için ilaç normu 30 – 60 l/da'dır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıklarını su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ
Domates (Sera), Patlıcan (Sera), Biber (Sera) - Kurşuni Küf: Çevrede hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Ekolojik koşullara ve hastalığın seyrine göre tekrar ilaçlamaya karar verilmelidir. Sezon içerisinde en fazla 3 uygulama yapılmalıdır.
Domates (Sera - Tarla) - Patlıcangillerde külleme: Uygulamalar tarla ve serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır. Hastalık ve iklim koşullarının seyrine göre 10 gün ara ile uygulamaya tekrarlanır. Bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde ve havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda yapılmalıdır.
Hıyar, Kornişon (Sera) - Sebzelerde beyaz çürüklük: Bulaşık olduğu bilinen alanda toprak uygulaması dikimden önce yeşil aksam uygulaması ise fidelerin şaşırtmasından sonra başlanılmalıdır. Bir üretim sezonunda maksimum 2 defa uygulama yapılmalıdır.
Çilek - Kurşuni küf:
1.ugulama: İlk çiçeklerin %10'u açınca,
2.uygulama: Çiçeklerin %50'si açınca,
3.uygulama: İlk yeşil meyvelerin görüldüğü dönemde yapılmalıdır.
Karpuz - Kabakgillerde Alternaria yaprak yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.
Kayısı, Kiraz, Şeftali, Nektarin, Vişne - Çiçek monilyası:
1.uygulama: Çiçeklenme başlangıcında (Çiçeklerin %5-10'u açtığında)
2.uygulama: Tam çiçeklenmede (Çiçeklerin %90-100'ü açtığında) yapılmalıdır.
Patates - Erken yaprak yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.
Soğan – Soğan Pası: İlaçlama, yeşil aksam ilaçlaması şeklinde yapılır. Yapraklarda pas püstülleri görülür görülmez ilaçlamaya başlanmalı ve hastalığın şiddeti, iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilmelidir.

INNOCHEM TARIM İLAÇLARI SAN. ve TİC. A.Ş

FUJİSAN

Suda Dağılabilen Granül (WG)

Grubu	C2:7	C3:11	Fungisit (Mantar İlacı)

%26,7 Boscalid + %6,7 Pyraclostrobin

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL:114

DEPOLAMA DURUMU
Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 4 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI
Firma bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

Şule ÇANAKCI
Ruhsatlandırma Uzmanı

INNOCHEM TARIM İLAÇLARI SAN. ve TİC. A.Ş
Altınova Sinan Mah. Kay Sk. No: 4 İç Kapı No: 39
KEPEZ / ANTALYA Tel: (0242) 312 00 42
Antalya Kurumlar V.D. 465 035 9329
Mersis:0465035932900017 - Tic. Sic. No: 108987

17 Eylül 2026
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Havuç – Külleme: Hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları dikkate alınarak uygulamaya 10 gün ara ile devam edilir. Bitkinin yeşil aksamını kaplayacak şekilde, havanın serin ve rüzgârsız olduğu zamanlarda uygulama yapılmalıdır.
Marul – Sebzelerde beyaz çürüklük: Bulaşık olduğu bilinen alanda toprak uygulaması dikimden önce, yeşil aksam uygulaması ise fidelerin şaşırtılmasından sonra başlanılmalıdır.
Çim alanları – Toprak kökenli hastalıklar: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır. Ekolojik koşullara ve hastalığın seyrine göre 10 gün ara ile devam edilir.
Karanfil (Sera) – Çökerten hastalığı: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulama yapılır. İkinci ve diğer ilaçlamalar hastalığın seyrine göre 10 gün aralıklarla tekrarlanır. İlaçlamalar fide diplerine can suyu uygulaması şeklinde yapılır.

Çevrede hastalık koşulları devam ediyorsa 10 gün aralıklarla ilaçlamalara devam edilir. Aynı ilaç ile uygulama en fazla 3 kez yapılmalıdır.

FUJİSAN hakkında bir şikâyetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ
FUJİSAN adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup C2:7, C3:11** olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **FUJİSAN'**ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip **(Grup C2:7, C3:11 harici)** bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU
FUJİSAN'nın diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez

17 Eylül 2026

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

INNOCHEM TARIM İLAÇLARI SAN. ve TİC. A.Ş

FUJİSAN

Suda Dağılabilen Granül (WG)

Grubu	C2:7	C3:11	Fungisit (Mantar İlacı)

%26,7 Boscalid + %6,7 Pyraclostrobin

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

RUHSAT SAHİBİ FİRMA
INNOCHEM TARIM İLAÇLARI SAN.ve TİC A.Ş
Altınova Sinan Mahallesi, Akay Sokak No:4, İç Kapı No:39, Kepez/ANTALYA
Tel: (0242) 312 00 42 | www.innochem.com.tr

ÜRETİM TESİSİ
SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
Kırımlı OSB. Mah. Zeytin Dalı Bulvarı No:36 Merkez/AKSARAY

Şule ÇANAKCI
Ruhsatlandırma Uzmanı

INNOCHEM TARIM İLAÇLARI SAN. ve TİC. A.Ş
Altınova Sinan Mah. Akay Sok. No: 4 İç Kapı No: 39
KEPEZ / ANTALYA Tel:(0242) 312 00 42
Antalya Kurumlar V.D. 485 035 9329
Mersis:0465035932900017 - Tic. Sic. No: 108987