İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih Ve Numarası: 23.01.2026/13999

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ*	Bağ mildiyösü *(Plasmopara viticola)*	100 ml / 100 l su	10 gün
Biber (Sera)	Çökerten ve Fide Kök Çürüklüğü *(Phytophthora spp.)*	100 ml/da	1 gün
Domates (Sera)	Çökerten ve Fide Kök Çürüklüğü *(Pythium sp., Phytophthora spp)*	100 ml/da	1 gün
Domates (Sera)	Mildiyö *(Phytophthora infestans)*	80 ml/100 l su	1 gün
Hıyar (Sera)	Kabakgillerde mildiyö *(Pseudoperonospora cubensis)*	80 ml/100 l su	1 gün
Kornişon (Sera)	Kabakgillerde mildiyö *(Pseudoperonospora cubensis)*	80 ml/100 l su	1 gün
Ispanak	Ispanak mildiyösü *(Peronospora farinosa f.sp. spinaciae)*	80 ml/da	7 gün
Kavun	Kabakgillerde mildiyö *(Pseudoperonospora cubensis)*	80 ml/da	1 gün
Marul	Marul Mildiyösü *(Bremia lactucae)*	80 ml/da	1 gün
Patates	Mildiyö *(Phytophthora infestans)*	80 ml/da	1 gün
Soğan	Soğan mildiyösü *(Peronospora destructor)*	80 ml/da	7 gün

***Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.**

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır. Bağ için ilaç normu 10-150 l/da'dır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA
21 Eylül 2026

INNOCHEM TARIM İLAÇLARI SAN. ve TİC. A.Ş

ILLAGRO

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	C8:45	H5:40	Fungisit (Mantar İlacı)

300 g/l Ametoctradin + 225 g/l Dimethomorph

- **Önce etiketi okuyunuz.**
- **Evde kullanmayınız.**
- **Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.**
- **Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.**
- **İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.**

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ: Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.
Soluma: Zehirlenme belirtileri görülmesi halinde etkilenen kişinin temiz havaya çıkarınız ve dinlendiriniz. Belirtiler devam ederse tıbbi yardım isteyiniz.
Cilt: Alerjik cilt reaksiyonlarina yol açar. Cildi bol su ile durulayınız. Etkilenme ciddi düzeydeyse Güvenlik Bilgi Formu ile doktora basvurunuz.
Göz: Gözlerle temas durumunda etkilenen kişinin gözlerini ovmasını veya kapatmasını engelleyerek ortam sıcaklığında bol suyla en az 15 dakika durulayınız. Kontakt lens varsa çıkarınız. Tıbbi yardım alınız.

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
İstanbul Bölge Müdürlüğü Başkan
İSTANBUL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Net miktarı:
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Ametoctradin, Dimethomorph, Etandiol, ,2-benzizotiyazol-3(2H)-on

ZARARLILIK İŞARETLERİ



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ
H302: Yutulması halinde zararlıdır.
H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H412: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.
H360F: Üremeye zarar verebilir.

ÖNLEM İFADELERİ
P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
P261: Buharını solumaktan kaçının.
P264: Kullandıktan sonra yıkayarak iyice temizleyiniz.
P280: Koruyucu eldiven/yüz koruyucu/koruyucu kıyafet/solunum koruma/koruyucu ayakkabı kullanın.
P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P501: İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası yönetmeliklere uygun bertaraf edin.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yer altı ve yer üstü sulara bulaştırmayınız.
- Boş ürün ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayınız.
- **KULLANMADAN ÖNCE ÇALKALAYINIZ.**

Sule CANAKCI
Ruhsatlandırma Uzmanı

INNOCHEM TARIM İLAÇLARI SAN. ve TİC. A.Ş
Altınova Sinan Mah. Atatürk Cad. No: 4 İç Kapı No: 39
KEPEZ / ANTALYA Tel: (0242) 312 00 42
Antalya Kurumlar V.D. 465 036 9829
Mersis: 0465035928900017 - Tic. Sic. No: 108987

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Bağ – Bağ Mildiyösü:

1. uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.

2. ve daha sonraki uygulamalar: Birinci ilaçlamadan sonra kullanılan ilacın etki süresi dikkate alınmalıdır.

Biber (Sera), Domates (Sera) - Çökerten ve Fide Kök Çürüklüğü: Ekimden önce, ekimden sonra, fidelerin toprak yüzüne çıkışından sonra ve fidelerin sera veya tarlaya şaşırtılmasından sonra yapılır.

Domates (Sera) – Mildiyö: Hastalığın her yıl görüldüğü ve zarar yaptığı üretim alanlarında hastalık belirtileri görülmeden, günlük ortalama sıcaklığın 16°C ve orantılı nemin en az %80 olması halinde başlanmalıdır. Hastalığın her yıl görülmediği alanlarda ise ilaçlamaya çevrede yada tarlada hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır.

Hıyar (Sera), Kornişon (Sera), Kavun - Kabakgillerde mildiyö: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak ilaçlamaya devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27°C'nin üstünde ve orantılı nemin de %50'nin altında olduğu zamanlarda ilaçlamaya ara verilmelidir.

Ispanak – Ispanak Mildiyösü: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır, hastalığın şiddetine göre 10 gün sonra ikinci bir uygulama yapılır.

Marul – Marul Mildiyösü: Fideliklerde hastalık görülmeden koruyucu bir ilaçlama yapılmalıdır. Mildiyö görülürse hasta kısımlar toplanıp yok edildikten sonra birer hafta aralarla fidelerin tarlaya şaşırtılmasına kadar ilaçlamalar sürdürülmelidir. Tarla devresinde hastalığın çevrede görülmesi ile ilaçlamaya başlanmalı, birer hafta aralarla hasattan en az bir hafta öncesine kadar devam edilmelidir.

Patates – Mildiyö: Mildiyönün her yıl görüldüğü ve büyük zarar yaptığı üretim alanlarında, hastalık belirtileri görülmeden, günlük ortalama sıcaklığın 16°C veya en düşük sıcaklığın 10°C'yi bulması ile ilaçlamaya başlanmalıdır. Hastalığın her yıl görülmediği alanlarda ise ilaçlamaya başlamak için çevrede ya da tarlada ilk hastalık belirtilerinin görülmesi beklenmelidir.

Soğan – Soğan Mildiyösü: Esas olarak günlük ortalama sıcaklığın 16°C'ye ulaşması ve orantılı nemin %80'i bulması ile mücadeleye başlanması gerekirse de yörede hastalığın ilk belirtilerinin saptanması ile ilaçlamalara başlanmalıdır.

ILLAGRO hakkında bir şikayetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

ILLAGRO adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup C8:45 ve H5:40** olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **ILLAGRO'**nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup C8:45 ve H5:40**) harici bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

ILLAGRO'nun diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI GIDA

INNOCHEM TARIM İLAÇLARI SAN. ve TİC. A.Ş

ILLAGRO

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	C8:45	H5:40	Fungisit (Mantar İlacı)

300 g/l Ametoctradin + 225 g/l Dimethomorph

Yutma: Ürün GBF'ini göstererek derhal tıbbi yardım alınız. Kusturmayınız, kusma durumunda başı öne doğru eğiniz. Etkilenen kişiyi yatar pozisyonda tutunuz. Ağzı su ile çalkalayınız.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: Özel bir antidotu yoktur Semptomik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dr. Neerja ÇAKIR ARIGAN Daire Başkanı 2023

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süreyle ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Firma ürünün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Ürünün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

INNOCHEM TARIM İLAÇLARI SAN.ve TİC A.Ş

Altınova Sinan Mahallesi, Akay Sokak No:4, İç Kapı No:39, Kepez/ANTALYA

Tel: (0242) 312 00 42 | www.innochem.com.tr

ÜRETİM TESİSİ

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

Kırımlı OSB. Mah. Zeytin Dalı Bulvarı No:36 Merkez/AKSARAY

Şule ÇANAKCI

Ruhsatlandırma Uzmanı

INNOCHEM TARIM İLAÇLARI SAN. ve TİC. A.Ş
Altınova Sinan Mah. Akay Sk. No: 4 İç Kapı No: 39
KEPEZ / ANTALYA Tel:(0242) 312 00 42
Antalya Kurumlar V.D. 465 036 9329
Mersis:0465035982300017 - Tic. Sic. No: 108987

21 Eylül 2026