İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarihi ve Numarası: 03.11.2023/12912

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama İle Hasat Arası Süre
*Bağ	Bağ mildiyösü (*Plasmopara viticola*)	75 ml/100 l su	21 gün
	Bağ küllemesi (*Erysiphe necator*)		
	Bağda ölükol (*Phomopsis viticola*)		
Hıyar	Kabakgillerde mildiyö (*Pseudoperonospora cubensis*)	60 ml/100 l su	3 gün
	Kabakgillerde külleme (*Erysiphe cichoracearum, Podosphaera xanthii*)	75 ml/100 l su	3 gün
Kornişon	Kabakgillerde mildiyö (*Pseudoperonospora cubensis*)	60 ml/100 l su	3 gün
	Kabakgillerde külleme (*Erysiphe cichoracearum, Podosphaera xanthii*)	75 ml/100 l su	3 gün
Kabak	Kabakgillerde külleme (*Erysiphe cichoracearum, Podosphaera xanthii*)	75 ml/100 l su	3 gün
Domates (Tarla)	Mildiyö (*Phytophthora infestans*)	75 ml/100 l su	3 gün
	Erken yaprak yanıklığı (*Alternaria solani*)		
Karpuz	Karpuzda alternarya yaprak yanıklığı (*Alternaria cucumerina*)	75 ml/da	3 gün
Biber (Sera)	Patlıcangillerde külleme (*Leveillula taurica*)	75 ml/100 l su	3 gün
Çeltik	Çeltik yanıklığı (*Pyricularia oryzae*)	100 ml/da	28 gün
Buğday	Septorya yaprak lekesi (*Septoria tritici*)	100 ml/da	56 gün
Çilek	Çilekte antraknoz (*Colletotrichum fragariae, Colletotrichum gloesporioides, Colletotrichum aculatum*)	75 ml/da	1 gün
Armut	Armut karalekesi (*Venturia pirina*)	75 ml/100 L su	7 gün
Buğday	Sarı pas (*Puccinia striiformis*)	100 ml/da	56 gün
Turunçgiller	Kahverengi leke (*Alternaria alternata f.sp.citri*)	75 ml/100 l su	21 gün

*** Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak alanlarda kullanılamaz.**

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI GIDA ... KONTROL ...

28 Eylül 2026

INNOCHEM TARIM İLAÇLARI SAN. ve TİC. A.Ş

QISHT

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	C3:11	Fungisit (Mantar İlacı)

250 g/l Azoxystrobin

- **Önce etiketi okuyunuz.**
- **Evde kullanmayınız.**
- **Çocuklardan gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.**
- **Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.**
- **İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız.**

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Önemli miktarda bünyeye alınmasını takriben mide bulantısı kusma ve karın ağrısıyla beraber ishal görülebilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ
Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.
Genel Tedbirler: Maddenin bulaştığı bütün giysiler derhal çıkarılmalıdır. Zehirlenme belirtileri geç ortaya çıkabileceğinden kazazedeyi en az 48 saat gözetim altında bulundurun.
Göz: Gözlerinizi bol su ile en az 15 dakika yıkayın. Lens varsa çıkartın. Hemen doktora başvurun.
Cilt: Kontamine olmuş bütün kıyafetleri çıkartın. Etkilenen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile iyice yıkayın. Eğer tahriş belirtileri varsa ürün etiketi ile doktora başvurun.
Soluma: Hastayı temiz havaya çıkartın, hareketsiz ve ılık tutun. Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)nin 114 no.lu acil durum hattını arayın ya da ambulans çağırın. Soluma güçlüğü varsa oksijen verin.

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı
T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Net miktarı:
Azami perakende satış fiyatı

İÇİNDEKİLER: Azoxystrobin

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ
H332: Solunması halinde zararlıdır.
H315: Cilt tahrişine yol açar.
H318: Ciddi göz hasarına yol açar.
H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ
P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P260: Tozunu/dumanını solumayın.
P273: Çevreye verilmesinden kaçının.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu /yüz koruyucu kullanın.
P501: İçeriği/kabı tehlikeli atık yönetmeliğine uygun be edin.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önle kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştır kaçınınız.
- Bitki Koruma Ürününün artıklarının imhası esnasında veya içmede kullanılan durgun veya akarsu kaynakları ürünle kirletmeyiniz.
- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak ediniz.
- Sulandırılmamış QISHT gözlerinizi ve derinizi tahriş Temas halinde gözünüzü ve derinizi hemen yıkayınız.
- Yeni uygulanan sahada hayvan otlatılmamalı, burada gıda maddesi toplanmamalıdır.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanm usulüne uygun olarak imha ediniz
- **KULLANMADAN ÖNCE İYİCE ÇALKALAYINIZ.**

Sule CANAKCI
Ruhsatlandırma Uzmanı

INNOCHEM TARIM İLAÇLARI SAN. ve TİC. A.Ş
Altınova Sinan Mah. Atatürk Cad. No: 4 İç Kapı No: 39
KEPEZ / ANTALYA Tel: (0242) 312 00 42
Antalya Kurumlar V.D. 465 035 9329
Mersis:0465035932900017 - Tic. Sic. No: 108987

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içerisinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi sağlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır. Bağ için ilaç normu 10-150 l/da'dır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ
Bağ- Bağ mildiyösü: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar 1. ilacın süresi ve hastalığın gelişme durumu meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile uygulama yapılır.
Bağ- Bağ küllemesi:
1. uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,
2. uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,
3. uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,
4. ve diğer uygulamalar: Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan ilacın etki süresine göre tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Bağ- Bağda ölükol:
Dormant dönem uygulaması: Budamadan sonra, gözler uyanmadan (tomurcuk patlamasından) 3-4 hafta önce dormant dönem uygulaması yapılır.
Yeşil aksam uygulaması: Vejetasyon döneminde aşağıdaki programa göre yapılır.
1. Uygulama: Gözlerin uyanma (Tomurcuk patlaması) başlangıcında,
2. Uygulama: Sürgünler 8-10 cm uzunluğa ulaştığı dönemde,
3. Uygulama Çiçeklenme döneminden hemen önce (çiçek salkımlarının belirdiği dönemde),
4. Uygulama: Çiçeklenme sonu-tane seti oluşumu başlangıcında yapılmalıdır.

Hıyar, Kornişon- Kabakgillerde mildiyö: Uygulama bitkiler kol atamaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre uygulamaların bitkinin her tarafını özelliklede yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.
Hıyar, Kornişon ve Kabak- Kabakgillerde külleme:
İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 °C'nin üstünde ve orantılı nemin de %50'nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.
Domates- Mildiyö: Mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

28 Eylül 2026

INNOCHEM TARIM İLAÇLARI SAN. ve TİC. A.Ş

QISHT

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	C3:11	Fungisit (Mantar İlacı)

250 g/l Azoxystrobin

Yutma: Yutulduğu takdirde şişenin kendisi, etiket ve mümkünse bu bilgi kâğıdı ile bir doktora başvurun, kusturmaya çalışmayın. Bilinci kapalı hastaya ağızdan bir şey vermeyin. Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)nin 114 no.lu acil durum hattını arayın ya da ambulans çağırın.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi dikkat uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEPOLAMA DURUMU
Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambal açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kin biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dış değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI
Firma ürünün etikette önerildiği şekil, zaman ve uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. İlacı depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanm doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etm

Şule ÇANAKCI
Ruhsatlandırma Uzmanı

INNOCHEM TARIM İLAÇLARI SAN. ve TİC. A.Ş
Altınova Sinan Mah. Akay Sk. No: 4 İç Kapı No: 39
KEPEZ / ANTALYA Tel: (0242) 312 00 42
Antalya Kurumlar V.D. 465 035 9329
Mersis:0465035932900017 - Tic. Sic. No: 108987

Domates- Erken Yaprak Yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda ilacın etki süresine bağlı olarak uygulama tekrarlanmalıdır.

Karpuz- Alternarıa Yaprak Yanıklığı: Kimyasal uygulama yeşil aksam uygulamaları şeklinde uygulanır. Çevrede ilk belirtilerin görülmesiyle uygulamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Biber (Sera)- Külleme: Bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanmalı ve gerektiğinde 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Çeltik- Çeltik yanıklığı: Yeşil aksam uygulamalarında hastalık ilk görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. Gerekli hallerde kullanılan ilacın etki süresi göz önüne alınarak ikinci ve üçüncü uygulamalar yapılmalıdır.

Buğday- Septorya yaprak lekesi: Eğer iklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa yeşil aksam uygulaması yapılır. Genel olarak uygulama için en iyi zaman bayrak yaprağının tamamen açıldığı kın döneminin sonu veya başak çıkışı öncesidir. Erken dönemde bitkinin üst kısımlarına doğru tırmanan bir enfeksiyon için bayrak yaprağının çıkması beklenmemelidir. Aynı şekilde tarla bulaşıksa ve başaklanma döneminde yağışlı havalar devam ediyorsa ekonomik zarar söz konusu olabileceğinden uygulamaya gerek duyulabilir. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda bitki koruma ürünlerinin etiketinde belirtilen etki süreleri dikkate alınmalıdır.

Çilek- Çilekte Antraknoz: Uygulamalara ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır. İlk uygulamadan sonra 10 gün sonra 2.uygulama yapılmalıdır.

Armut – Karaleke:

1. uygulama: Çiçek gözleri kabardığında, (Dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce yapılır)

2. uygulama: Beyaz rozet döneminde,

3. uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,

4. ve diğer uygulamalar: Kullanılan fungisitlerin etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Buğday – Sarı pas: Hastalığının erken dönemde alt yapraklardaki belirtileri her yıl görülebilir. Bu nedenle iklim koşulları dikkate alınarak (%90 orantılı nem ve 15-20°C sıcaklık) hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam ilaçlamasına başlanmalıdır. İklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa, kullanılan ilacın etki süresine göre ilaçlama tekrarlanabilir.

Turunçgiller - Kahverengi leke: İlaçlamalar hasattan önce veya hasattan sonra yapılmalıdır. Hasattan önce yapılacak uygulamalarda son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilmelidir.

QISHT hakkında bir şikâyetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: QISHT adlı bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre grup C3:11 sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **QISHT**'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C3:11 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: QISHT'in Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
28 Eylül 2026

INNOCHEM TARIM İLAÇLARI SAN. ve TİC. A.Ş

QISHT

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	C3:11	Fungisit (Mantar İlacı)

250 g/l Azoxystrobin

T.C.
Dr. Nesrin ÇAKIR ARIC
Daire Başkanı

RUHSAT SAHİBİ FİRMA
INNOCHEM TARIM İLAÇLARI SAN.ve TİC A.Ş
Altınova Sinan Mahallesi, Akay Sokak No:4, İç Kapı No:3
Kepez/ANTALYA
Tel: (0242) 312 00 42 | www.innochem.com.tr

ÜRETİM TESİSİ
SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
Kırımlı OSB. Mah. Zeytin Dalı Bulvarı No:36 Merkez/AKS

Şule ÇANAKCI
Ruhsatlandırma Uzmanı

INNOCHEM TARIM İLAÇLARI SAN. ve TİC. A.Ş
Altınova Sinan Mah. Akay Sk. No: 4 İç Kapı No: 39
KEPEZ / ANTALYA Tel:(0242) 312 00 42
Antalya Kurumlar V.D. 465 035 9329
Mersis:0465035932900017 - Tic. Sic. No: 108987