İmal tarihi:
Son kullanma tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarihi ve No: 17.11.2014/9906

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates	Sebze fidelerinde çökerten ve kök çürüklüğü *(Fusarium spp., Phythium spp.)*	150 ml/100 l su (3 L/m² mahlül)	7 gün
Domates (sera)	Kök boğazı çürüklüğü *(Fusarium oxysporum)*	500 ml/da (damlama sulama ile)	3 gün
Tütün	Çökerten *(Fusarium spp., Pythium spp.)*	200 ml/100 l su (3 L/m² mahlül)	-
Biber (Sera)	Toprak kökenli patojenler *(Fusarium spp.)*	500 ml/da (Damlama sulama ile)	3 gün
Hıyar	Çökerten (Damping-off) *(Fusarium Spp.,Pythium Spp.)*	300 ml/100 l su (3 L/m² mahlül)	7 gün
Kornişon	Çökerten (Damping-off) *(Fusarium Spp.,Pythium Spp.)*	300 ml/100 l su (3 L/m² mahlül)	7 gün
Muz	Fusarium Kök Çürüklüğü Hastalığı *(Fusarium oxysporum)*	750 ml/da	-
Kabak	Çökerten (Damping-off) *(Fusarium Spp.,Pythium Spp.)*	300 ml/100 l su (3 L/m² mahlül)	7 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışımlı su deposya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON
Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır. **Damlama sisteminin kalibrasyonu:** Baştan ve sondan 3 meme 10 dakika çalıştırılarak debisi ölçülür. Sapma %10'u geçmemelidir. Dekara verilecek BKÜ için gerekli su miktarı belirlenir.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ONAYLAMIŞTIR 10 ARALIK 2026 Dr. Nesrin ÇEKİÇ KARACAN Daire Başkanı

INNOCHEM

INNOCHEM TARIM İLAÇLARI SAN. ve TİC. A.Ş

REPPORT 36 SL

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grubu	A3:32	Fungisit (Mantar İlacı)

360 g/l Hymexazole

- **Önce etiketi okuyunuz.**
- **Evde kullanmayınız**
- **Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz**
- **Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.**
- **İnsan ve çevre sağlığı üzerindeki riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.**

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

- **Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ: Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.
Cilt: Su ile yıkayın. Yıkamanın ardından belirtiler ciddi veya kalıcı ise tıbbi yardım alın.
Göz: Hemen bol su ile yıkayın. Gözlerinizi ovmayın. Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. En az 15 dakika yıkamaya devam edin ve tıbbi yardım alın.
Solunum: Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Solunum yollarının açık kalmasını sağlayın. Yaka kravat veya kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin. Solunum zorluğu çekildiğinde uygun eğitimli personel tarafından kazazedeye oksijen verilebilir. Tıbbi yardım alın. Bilinci yerinde olmayan kişiyi ilk yardım pozisyonunda yan tarafına yatırın ve solunumun gerçekleşebilmesini sağlayın.
Yutma: Ağzı suyla iyice çalkalayın. Birkaç bardak su veya süt içirin. Kusma tehlikeli olabileceğinden dolayı, kazazede kendini rahatsız hissederse kusmayı durdurun. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Bilinci yerinde olmayan kişiyi ilk yardım pozisyonunda yan tarafına yatırın ve solunumun gerçekleştirilebilmesini sağlayın. Kazazedeyi gözlem altında tutun. Tıbbi yardım alın.
ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: Özel bir antidotu yoktur. Aktif kömürle mide yıkanır. Kan dolaşımına yardım maksadıyla plazma ve Novacrol tatbik edilir.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ UZEM TEL:114

Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İçindekiler: Hymexazole, Potasyum hidroksit

ZARARLILIK İŞARETLERİ



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ
H302: Yutulması halinde zararlıdır.
H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H412: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

ÖNLEM İFADELERİ
P264: Elleçlemeden sonra cildi iyice yıkayın.
P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu /yüz koruyucu kullanın.
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika durulayın. Takılı ve yapılması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P332+P313 Ciltte tahriş söz konusu ise tıbbi yardım/ müdahale alın.
P337+P313 Göz tahrişi kalıcı ise Tıbbi yardım/bakım alın.
P501 İçeriği/kabı 'Atık Yönetimi Yönetmeliği' uyarınca bertaraf edin.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
•Bitki koruma ürününü serin, kuru ve iyi havalanabilen yerlerde muhafaza ediniz.
•Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
•Balıklar için zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

Şule ÇANAKCI
Ruhsatlandırma Uzmanı
INNOCHEM TARIM İLAÇLARI SAN. ve TİC. A.Ş
Altınova Sinan Mah. [illegible] No: 4 İç Kapı No: 39
KEPEZ / ANTALYA Tel: (242) 312 00 42
Antalya Kurumlar V.D. 465 035 9329
Mersis:0465035932900017 - Tic. Sic. No: 108987

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurulduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ
Süzgeçli kova ile uygulama (Domates, Tütün, Hıyar, Kornişon, Kabak): Tohumlar ekildikten hemen sonra m^2 ye 3 litre karışım (Mahlul) gelecek şekilde süzgeçli kova veya ilaçlama makinesi ile toprak yüzeyine uygulama yapılır.
Biberde damlama sulama ile uygulama: Dekara hesaplanan bitki koruma ürünü miktarı, damlama sulama ünitesi 10 dakika çalıştırılarak, damlama sulama ile toprağa verilir. 1. uygulama dikimden 1 gün sonra, 2. Uygulama birinci uygulamadan 30 gün sonra yapılır.
Muzda uygulama: Dikim sonrası dekara 750 ml bitki koruma ürünü uygun bir yöntemle (damlama sulama) toprağa verilir. Hastalık belirtileri ortaya çıktıktan sonra kimyasal mücadele etkili değildir.
Çim alanlarında uygulama: Dikimden sonra dekara 400 ml bitki koruma ürünü gelecek şekilde yeşil aksam uygulaması yapılır.
Domatesde (sera) damlama sulama ile uygulama: Dekara hesaplanan bitki koruma ürünü miktarı, damlama sulama ünitesi 10 dakika çalıştırılarak, damlama sulama ile toprağa verilir. 1. uygulama dikimden 1 gün sonra, 2. uygulama birinci uygulamadan 30 gün sonra yapılır.

REPPORT 36 SL hakkında bir şikayetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ
REPPORT 36 SL adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A3: 32 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için **REPPORT 36 SL'** nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A3: 32 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU
REPPORT 36 SL' nin diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR
20-10-2026

INNOCHEM TARIM İLAÇLARI SAN. ve TİC. A.Ş

REPPORT 36 SL

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grubu	A3:32	Fungisit (Mantar İlacı)

360 g/l Hymexazole

Nesrin ÇANKAYA ARICAN
Şube Müdürü

DEPOLAMA DURUMU
Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI
Firma, bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA
INNOCHEM TARIM İLAÇLARI SAN.ve TİC A.Ş
Altınova Sinan Mahallesi, Akay Sokak No:4, İç Kapı No:39,
Kepez/ANTALYA
Tel: (0242) 312 00 42 | www.innochem.com.tr

ÜRETİM TESİSİ
SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
Kırımlı OSB. Mah. Zeytin Dalı Bulvarı No:36 Merkez/AKSARAY

Şule ÇANAKCI
Ruhsatlandırma Uzmanı

INNOCHEM TARIM İLAÇLARI SAN. ve TİC. A.Ş
Altınova Sinan Mah. Akay Sok. No: 4 İç Kapı No: 39
KEPEZ / ANTALYA (0242) 312 00 42
Antalya Kurumlar V.D. 465 035 9329
Mersis:0465035932900017 - Tic. Sic. No: 108987